

8338 - 98 / 61

LW320opgenomen door : C Baeteman
datum : januari 99

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.:	y-coörd.:	Boormethode en datum:	
B 10	Oostende, Verbinding Kennedy - De Bolle	(6.68 m ?)			10.12.98	
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
0,10 - 0,65 (gewend, pot)	zwartpijs	kleengruis gemengd met klei brokken	.			
0,65 - 1,00 (gewend, pot)	beigebruin	zeer fijn zand tot niet gemengd met klei brokjes	+			
1,00 - (200)	beigebruin	stiek nietus zeer fijn zand talrijke oase gevulde klei brokjes (scheef en houwtaal)	+		poradisch gevuld veenbrokjes	
<u>200-420</u> 200-420 welkom aan	beigebruin beigebruin			↓		
2,00 - 2,80)	vlamruven	220 tot 300				
280 - 3,40	bruin grijs	nietus en iet kleip zeer fijn zand aan basis = enkele geleende m.u. dikke kleilaminae (scheef geleend)	+		weinig fijn schelpgruis p 3.10: brok stiek kumense klei	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :
datum :

3

NR. 810	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:
------------	--------------------------	----------	------------------------	-----------------------

diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
5.60 - 600 (ontleent van 6.00 - 6.13)	donkergr (reductie- kleur)	iets kleef fijn tot zeer fijn zand met onregelmatige kleilensen en - laminae	+	↓	5.72 = Concentratie van Cardiums (^{grote} 1/schilbelle en juvenieljes in een pocket) talrijke juveniele Cardiumkeelken en andere schelpfragmentjes	
6.13 - 680	gr vulruimte van 6.87 - 700	iets kleef fijn tot zeer fijn zand lang 6.35: met cm- dikke zwarte kleilaminae waarin mm-dikke lende laminae	+		dubbele Cardium op 6.15 6.72: concentratie v. Cardiums en fragmenten v. Scrobicularia	
680 - 710	donkergr	ex subhoriz. fijne afwisseling loz.] gelased van - veendelities en - klei en - f. zandig nit	+		peleudelijf minder veendelities	

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :
datum :

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.: y-coörd.:	Boormethode en datum:		
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
7.10-743	Zwart (reductiekleur)	Zware zand klei enkele mm-zandlaminae naar onder toe	+	scherp schief erosief	talrijke mossels (ook dubbel) nog weinig veen detritus en een enkel schief flat-geveld veenholpje	
7.43-770	bruingrijs	sterk siltuze klei iets humeus	++			
770-850	grijs en bruingrijs puilij door mekaar	klei met silt en verticale mm-zandlaminae (duidelijk afgepleeten blokken klei) tussen 7.93-8.00: met onregelmatige zand irissen, veenholpjes basis = 8.45-8.50 = 1 klei en veenholpjes puilij gemengd in zand	+		erosief	Hydratie x Cardiumhofmuntjes

Interpretatie :

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

opgenomen door :

datum :

(5)

NR.	Kaartblad Lokalisatie	Maaiveld	x-coörd.:	y-coörd.:	Boormethode en datum:	
810						
diepte	kleur	textuur	CaCO ₃	grens	kenmerken	stratigrafie
8.50 - 8.73	bruinachtig grijp	regelmatige afwisseling, mm- gelaagd, scheef, van bijzand/net/klei	+		veel detritus in de klei	
8.73 - 8.82	grijs	mengeling van klei, zanden veel rieten, net rinten,	+		(erosiefakket) Hydraria & fragmenten v. Terribiliana	
8.82 - 8.87	bruin	veen, riet & hout (zeer amorf en compact)	-	erosief		
8.87 - 933	grijs	zware klei	-	geluidelijk		veel rieten
933 -	grijs	zware klei met rietlaminale horizontale mm-gelaagdkind zones waar klei & net gemengd zijn door rietstubs ca. 9.60: netgebale verminderd	+	zeer geluidelijk		veel kleine sporen van listurbale afg enkele riet doorgroeiingen

Interpretatie :

en klei gebalte verminderd
wordt riet p. sandp (in mm-laminae)

Speciale bemonstering :

Opmerkingen :

Kleide domein 10...

Interpretatie = Z.O.Z

Opwelling : 0,00 - 100 m.

Kwartair - Holoceen : 1.00 m - 5.15 : opwelling ^{jonge} erosiegeue

~~?? Pleistocen / Holocen~~ : 5.15 m - (10.00 m) (mogelijks ook Pleistocen / Een)

C. Baeteman.